

## PREPARACIÓN PARA GASTROSCOPIA

### RECUERDE

**6 HORAS ANTES DE SU CITA NO PODRÁ INGERIR SÓLIDOS NI LÍQUIDOS, EXCEPTO AGUA HASTA 3 HORAS ANTES DE SU CITA.**

Es obligatorio venir acompañado por un adulto.

No podrá conducir ni usar maquinaria después de la prueba.

Si usted es diabético se aconseja dieta líquida desde las 12 horas anteriores a su cita. (Teniendo en cuenta que 6 horas antes no podrá tomar nada, excepto agua hasta 3 horas antes).

### SI SU MEDICACIÓN HABITUAL ES:

- **Anticoagulantes orales** como: Sintrom®, Aldocumar®, Rivaroxabán/Xarelto®, Davigatrán/Pradaxa®, Apixabán/Eliquis®, etc. o **Antiagregantes orales** como: Clopidogrel/Iscover®/Plavix®, etc., debe contactar con su médico para valorar suspensión o sustitución.
- **Ácido Acetilsalicílico (Aspirina®/Adiro®)** a dosis diarias superiores a 300 mg, debe reducir a 100 mg durante los 7 días previos a la Gastroscoopia.
- **Antidiabéticos Orales:** no tomarlos desde que inicia el ayuno de líquidos (3 horas antes)
- **Insulina:** no es necesario modificar su pauta. Excepto que su ayuno se prolongue a más de 8 horas, en esta situación deberá disminuir su dosis habitual. **En caso de hipoglucemia puede ingerir medio vaso de agua con una cucharada de azúcar para revertirla.**
- **Si usted es Hipertenso, NO debe suspender su medicación.** La puede tomar hasta 2 horas antes con una mínima cantidad de agua, la necesaria para tragar.